



INFORMATION FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann werden Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen bei Hämorrhoiden, Juckreiz in der Analgegend angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bei stark ausgeprägtem Blutabgang mit dem Stuhl, hartnäckigem Andauern der vorhandenen Beschwerden über 14 Tage hinaus sowie Auftreten ungewohnter bzw. neuer Krankheitserscheinungen ist ein Arzt oder eine Ärztin aufzusuchen, um die Möglichkeit anderer Krankheitsursachen auszuschließen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

- an anderen Krankheiten leiden,
- Allergien haben oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Dürfen Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, 3 mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser einnehmen. Bei stärkeren Beschwerden zu Beginn der Behandlung auch einige Tage lang 4-6 mal täglich 10-15 Tropfen. Bis zum Eintritt völliger Beschwerdefreiheit 1-2 mal täglich 10-15 Tropfen einnehmen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen haben?

Für Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemässigem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ärztin oder Apothekerin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Die Tropfen enthalten 36 Vol.-% Alkohol.

Was ist in Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen enthalten?

10 ml enthalten: Acidum nitricum D6 1ml, Aesculus hippocastanum D2 1ml, Collinsonia canadensis D4 1ml, Graphites D8 1ml, Hamamelis virginiana D3 1ml, Paeonia officinalis D3 1ml, Strychnos nux vomica D4 1ml, Sulfur D5 1ml und als Hilfsstoffe Wasser und Alkohol. Enthält 36 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer: 45043 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.
Tropfflaschen zu 50 ml.

Zulassungsinhaber:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Herstellerin:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim

Diese Packungsbeilage wurde in 09/2005 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

Lisez attentivement cette notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par votre pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin

Médicament homéopathique

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin peuvent être utilisées en cas d'hémorroïdes, de prurit anal.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Consulter un médecin pour exclure la possibilité d'autres affections lors de perte de sang importante dans les matières fécales, lorsque les troubles persistent plus de 2 semaines ou bien si des symptômes inhabituels ou nouveaux apparaissent.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si ce médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement, ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin?

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau. En cas de douleurs plus aiguës, prendre 10 à 15 gouttes 4 à 6 fois par jour pendant

quelques jours au début du traitement. Puis jusqu'à disparition complète des douleurs, prendre 10 à 15 gouttes 1 à 2 fois par jour.

Veillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les gouttes contiennent 36% vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin?

10 ml contiennent: Acidum nitricum D6 1ml, Aesculus hippocastanum D2 1ml, Collinsonia canadensis D4 1ml, Graphites D8 1ml, Hamamelis virginiana D3 1ml, Paeonia officinalis D3 1ml, Strychnos nux vomica D4 1ml, Sulfur D5 1ml, eau et alcool comme excipients. Contient 36% vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation: 45043 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabricant:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic): 09/2005.

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perchè contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin

Medicinale omeopatico

In quali casi trovano impiego le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin trovano principalmente impiego in caso di emorroidi e di prurito anale.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

In caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

In caso di elevata presenza di sangue nelle feci, di persistenza dei sintomi per un periodo superiore ai 14 giorni, nonché in caso di insorgenza improvvisa di manifestazioni cliniche nuove o insolite, consultare il medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno. In caso di disturbi di maggiore gravità, iniziare il trattamento con 10-15 gocce 4-6 volte al giorno. Dopo la scomparsa totale dei sintomi continuare con 10-15 gocce, 1-2 volte al giorno.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R13 Prohämorrhin e informi il suo medico o farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista.

Le gocce contengono alcool 36 % Vol.

Che cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg R13 Prohämorrhin?

10 ml contengono: Acidum nitricum D6 1 ml, Aesculus hippocastanum D2 1 ml, Collinsonia canadensis D4 1 ml, Graphites D8 1 ml, Hamamelis virginiana D3 1 ml, Paeonia officinalis D3 1 ml, Strychnos nux-vomica D4 1 ml, Sulfur D5 1 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 36 % vol.

Numero dell'omologazione: 45043 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg R13 Prohämorrhin? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabbricante:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Data dell'ultima revisione da parte dell'autorità farmaceutica competente (Swissmedic) di questo foglietto illustrativo: 09/2005.