



INFORMATION FÜR PATIENTEN

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann werden Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen bei Prostatabeschwerden angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wenn die Prostatabeschwerden anhalten oder zunehmen, ist eine ärztliche Untersuchung notwendig.

Wann dürfen Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie
– an anderen Krankheiten leiden,
– Allergien haben oder
– andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, 3mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen. In akuten Fällen alle 5-10 Minuten 10 Tropfen. Bei verschleppten Fällen je nach Schwere der Erscheinung alle 1-2 Stunden 10 Tropfen, mit eintretender Besserung seltener.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes/Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen haben?

Für Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen ab, und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15-25° C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Die Tropfen enthalten 36 Vol.-% Alkohol.

Was ist in Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen enthalten?

10 ml enthalten: Chimaphila umbellata D3 1 ml, Clematis vitalba D3 1 ml, Conium maculatum D5 1 ml, Ferrosi picras D4 1 ml, Pareira brava D2 1 ml, Populus tremuloides D3 1 ml, Pulsatilla pratensis D3 1 ml, Serenoa repens (Sabal serrulatum) D2 1 ml und als Hilfsstoffe Wasser und Alkohol.

Enthält 36 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer:

45054 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R25 Prostatan Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

Zulassungsinhaberin:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Herstellerin:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim

Diese Packungsbeilage wurde in 07/2004 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan

Médicament homéopathique

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan peuvent être utilisées en cas de troubles de la prostate.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan peuvent être prises simultanément. Lorsque les troubles de la prostate persistent ou s'aggravent, il est nécessaire de consulter un médecin.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

- vous souffrez d'une autre maladie,
- vous êtes allergique,
- vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas et selon la gravité des symptômes, prendre 10 gouttes toutes les 1 à 2 heures, puis diminuer la fréquence de la dose après amélioration.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15-25° C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les gouttes contiennent 36 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

10 ml contiennent: Chimaphila umbellata D3 1 ml, Clematis vitalba D3 1 ml, Conium maculatum D5 1 ml, Ferrosi picras D4 1 ml, Pareira brava D2 1 ml, Populus tremuloides D3 1 ml, Pulsatilla pratensis D3 1 ml, Serenoa repens (Sabal serrulatum) D2 1 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 36 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation: 45054 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R25 Prostatan? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabricant:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic): 07/2004.

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o seguì le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan

Medicinale omeopatico

In quali casi trovano impiego le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan trovano principalmente impiego in caso di disturbi della prostata.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan.

In caso di persistenza o peggioramento delle affezioni prostatiche consultare il medico.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Finora non si conoscono limitazioni d'uso.

Se è usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

Salvo diversa prescrizione medica, assumere 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al dì prima dei pasti. In casi acuti 10 gocce ogni 5-10 minuti. In casi persistenti, a seconda della gravità dei sintomi, assumere 10 gocce ogni 1-2 ore, a miglioramento ottenuto aumentare l'intervallo fra le somministrazioni.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico.

Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini.

Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista.

Le gocce contengono alcool 36 % Vol.

Che cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan?

10 ml contengono: Chimaphila umbellata D3 1 ml, Clematis vitalba D3 1 ml, Conium maculatum D5 1 ml, Ferrosi picras D4 1 ml, Pareira brava D2 1 ml, Populus tremuloides D3 1 ml, Pulsatilla pratensis D3 1 ml, Serenoa repens (Sabal serrulatum) D2 1 ml e come excipienti alcool e acqua.

Contiene alcool 36 % Vol.

Numero dell'omologazione: 45054 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R25 Prostatan? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabbricante:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Data dell'ultima revisione da parte dell'autorità farmaceutica competente (Swissmedic) di questo foglietto illustrativo: 07/2004.