



## INFORMATION FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

### Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

#### Wann werden Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen bei Durchfall angewendet werden.

#### Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

#### Wann dürfen Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bei Durchfall bei Kindern unter 3 Jahren muss ein Arzt, eine Ärztin konsultiert werden.

Wenn der Durchfall von Fieber begleitet ist, wenn Verdacht auf Blut im Stuhl besteht, so ist ein Arzt, eine Ärztin, ein Apotheker, eine Apothekerin zu konsultieren.

Wenn die Beschwerden länger als 3 Tage anhalten oder wenn die Beschwerden sich wiederholen, so ist ein Arzt, eine Ärztin, ein Apotheker, eine Apothekerin zu konsultieren.

Besonders bei älteren Menschen und Kindern muß zusätzlich auf eine ausreichende Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr geachtet werden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie  
– an anderen Krankheiten leiden,  
– Allergien haben oder  
– andere Arzneimittel (auch selbstgekauft) einnehmen oder äusserlich anwenden!

#### Dürfen Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

#### Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, bei fiebhaft verlaufenden Durchfällen im akuten Stadium alle 15 Minuten bis stündlich 20 Tropfen unverdünnt einnehmen. Sobald die Durchfälle nachlassen oder das Fieber sinkt, nimmt man alle 1-2 Stunden 10-15 Tropfen. Nach Abklingen der Erscheinungen noch einige Tage lang 3 mal täglich 10-15 Tropfen einnehmen. Bei fieblos verlaufenden Durchfällen alle 1-3 Stunden 10-15 Tropfen. Bei chronischen Durchfällen über einen längeren Zeitraum 3 mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser einnehmen.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

#### Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen haben?

Für Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen bemerken, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

#### Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden. Bei Raumtemperatur (15-25° C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Die Tropfen enthalten 36 Vol.-% Alkohol.

#### Was ist in Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen enthalten?

10 ml enthalten: Acidum phosphoricum D3 1 ml, Baptisia D4 1 ml, Chamomilla D4 1 ml, Colocynthis D6 1 ml, Mercurius sublimate corrosivus D5 1 ml, Oleander D6 1 ml, Veratrum album D6 1 ml, und als Hilfsstoffe Wasser und Alkohol.

Enthält 36 Vol.-% Alkohol.

#### Zulassungsnummer:

45036 (Swissmedic)

#### Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

#### Zulassungsinhaberin:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA  
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Herstellerin:  
Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim

Diese Packungsbeilage wurde in 10/2006 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

## INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

### Gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin

Médicament homéopathique

#### Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin peuvent être utilisées en cas de diarrhée.

#### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin peuvent être prises simultanément.

#### Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Lors de diarrhée chez des enfants de moins de 3 ans, le médecin doit être consulté.

Lorsque la diarrhée est accompagnée de fièvre, lorsqu'il existe une suspicion de présence de sang dans les selles, un médecin, un pharmacien doit être consulté.

Lorsque les troubles durent plus de trois jours ou se répètent, un médecin, un pharmacien doit être consulté.

Il convient de veiller à un apport suffisant de liquide et d'électrolytes, en particulier chez les personnes âgées et chez les enfants.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

– vous souffrez d'une autre maladie,

– vous êtes allergique,

– vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

#### Les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin peuvent-elles être prises/utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.



### **Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin?**

Sauf prescription contraire du médecin, en cas de diarrhées aiguës accompagnées de fièvre, prendre toutes les 15 minutes en diminuant jusqu'à toutes les heures, 20 gouttes non diluées. Dès que les diarrhées diminuent ou lorsque la fièvre tombe, prendre 10 à 15 gouttes toutes les 1 à 2 heures. Une fois les symptômes disparus, continuez à prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour pendant quelques jours. En cas de diarrhées non accompagnées de fièvre, prendre 10 à 15 gouttes toutes les 1 à 3 heures. En cas de diarrhées chroniques, prendre 10 à 15 gouttes dans un peu d'eau 3 fois par jour pendant une assez longue période de temps.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin.

Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Adressez-vous à votre médecin, ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

### **Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin peuvent-elles provoquer?**

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin et informez votre médecin ou votre pharmacien.

### **A quoi faut-il encore faire attention?**

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les gouttes contiennent 36 % vol. d'alcool.

### **Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin?**

10 ml contiennent: Acidum phosphoricum D3 1 ml, Baptisia D4 1 ml, Chamomilla D4 1 ml, Colocynthis D6 1 ml, Mercurius sublimatus corrosivus D5 1 ml, Oleander D6 1 ml, Veratrum album D6 1 ml, eau et alcool comme excipients.

Contient 36 % vol. d'alcool.

### **Numéro d'autorisation: 45036 (Swissmedic)**

### **Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?**

En pharmacie sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 50 ml.

#### **Titulaire de l'autorisation:**

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA  
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

#### **Fabricant:**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic): 10/2006.

## **INFORMAZIONI PER I PAZIENTI**

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perché contiene informazioni importanti. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o seguì le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occasione.

### **Gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin**

Medicinale omeopatico

#### **In quali casi trovano impiego le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin?**

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin trovano principalmente impiego in caso di diarrea.

#### **Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?**

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin.

#### **Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?**

In caso di diarrea nei bambini di età inferiore ai 3 anni, consultare il medico.

In caso di diarrea accompagnata da febbre, o di sospetta presenza di sangue nelle feci, consultare il medico o il farmacista.

In caso di persistenza dei sintomi per più di 3 giorni o quando si ripetono, consultare il medico o il farmacista.

Soprattutto negli anziani e nei bambini occorre far attenzione ad un apporto sufficiente di liquidi ed elettroliti.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

#### **Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin durante la gravidanza o l'allattamento?**

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

#### **Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin?**

Salvo diversa prescrizione medica, assumere in caso di diarrea accompagnata da febbre 20 gocce non diluite ogni 1/4-1 ora. Alla scomparsa della diarrea o febbre ridurre a 10-15 gocce ogni 1-2 ore. Continuare alcuni giorni anche dopo la scomparsa totale dei sintomi con 10-15 gocce 3 volte al di. Sindrome diarreica non febbrale: 10-15 gocce ogni 1-3 ore. Diarrea cronica: 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al di per un periodo prolungato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal medico.

Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico.

Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

#### **Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin?**

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravation initiale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin e informi il medico o il farmacista.

#### **Di che altro occorre tener conto?**

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare fuori della portata dei bambini.

Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista.

Le gocce contengono alcool 36 % Vol.

#### **Che cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin?**

10 ml contengono: Acidum phosphoricum D3 1 ml, Baptisia D4 1 ml, Chamomilla D4 1 ml, Colocynthis D6 1 ml, Mercurius sublimatus corrosivus D5 1 ml, Oleander D6 1 ml, Veratrum album D6 1 ml e come eccipienti alcool e acqua.

Contiene alcool 36 % Vol.

#### **Numeri dell'omologazione: 45036 (Swissmedic)**

#### **Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R4 Enterocolin? Quali confezioni sono disponibili?**

In vendita in farmacia senza ricetta medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

#### **Titolare dell'omologazione:**

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA  
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

#### **Fabbricante:**

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH  
D - 64625 Bensheim

Data dell'ultima revisione da parte dell'autorità farmaceutica competente (Swissmedic) di questo foglietto illustrativo: 10/2006.