



INFORMATION FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, bevor Sie das Arzneimittel einnehmen bzw. anwenden.

Dieses Arzneimittel ist Ihnen persönlich verschrieben worden, und Sie dürfen es nicht an andere weitergeben. Auch wenn diese die gleichen Krankheitssymptome haben wie Sie, könnten Ihnen das Arzneimittel schaden.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann werden Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen angewendet?

Gemäß homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen auf Verschreibung Ihres Arztes oder Ihrer Ärztin bei Herzrhythmusstörungen, Herzklopfen, erhöhtem Puls, nervösem Herz, zur Unterstützung nach Herzmuskelkrankungen sowie nach Herzinfarkt angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemässem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie
– an anderen Krankheiten leiden,
– Allergien haben oder
– andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äußerlich anwenden!

Dürfen Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder Apotheker bzw. die Ärztin oder Apothekerin um Rat fragen.

Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, bei akuten Herzbeschwerden alle 15 Minuten bis stündlich 10 Tropfen einnehmen und zur Abklärung der Beschwerden sofort einen Arzt zu Rate ziehen. Bei chronischen Beschwerden 3mal täglich 10-15 Tropfen in etwas Wasser vor den Mahlzeiten einnehmen. Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen haben?

Für Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen ab, und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15-25° C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Die Tropfen enthalten 38 Vol.-% Alkohol.

Was ist in Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen enthalten?

10 ml enthalten: Ammi visnaga D2 2 ml, Cytisus scparius (Spartium scoparium) D2 2 ml, Iberis amara D3 1 ml, Leonurus cardiaca D2 2 ml, Nerium oleander D3 1 ml, Sumbulus moschatus D2 2 ml.

Enthält 38 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer: 45093 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken nur gegen ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

Zulassungsinhaberin:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Herstellerin:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim

Diese Packungsbeilage wurde in 11/2004 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

Lisez attentivement la notice d'emballage avant de prendre ou d'utiliser le médicament. Ce médicament vous a été remis personnellement sur ordonnance médicale. Ne le remettez donc pas à d'autres personnes, même si elles semblent présenter les mêmes symptômes que vous. En effet, ce médicament pourrait nuire à leur santé.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin

Médicament homéopathique

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin peuvent être utilisées sur prescription de votre médecin en cas de troubles du rythme cardiaque, de palpitations, de pouls rapide, de troubles cardiaques d'origine nerveuse et comme adjuant après un infarctus du myocarde.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

– vous souffrez d'une autre maladie,
– vous êtes allergique,
– vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin peuvent-elles être prises/utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.



Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin?

Sauf prescription contraire du médecin, et en cas de troubles cardiaques aigus, prendre 10 gouttes toutes les 15 minutes, puis toutes les heures, et consulter un médecin immédiatement pour diagnostiquer l'origine des troubles. En cas de troubles chroniques, prendre 10 à 15 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau avant les repas.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimatez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15-25° C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les gouttes contiennent 38 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin?

10 ml contiennent: Ammi visnaga D2 2 ml, Cytisus scparius (Spartium scorarium) D2 2 ml, Iberis amara D3 1 ml, Leonurus cardiaca D2 2 ml, Nерium oleander D3 1 ml, Sumbulus moschatus D2 2 ml.

Contient 38 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation: 45093 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sur ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabricant:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic): 11/2004.

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di fare uso del medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute. Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin

Medicinale omeopatico

In quali casi trovano impiego le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin trovano principalmente impiego su prescrizione del suo medico in caso di aritmia cardiaca, di palpazioni, di tachicardia, di disturbi cardiaci su base nervosa, come adiuvante dopo un infarto miocardico.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

Finora non si conoscono limitazioni d'uso. Se è usato correttamente non è necessario adottare particolari precauzioni.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia non sono mai stati effettuati studi scientifici sistematici. Per precauzione dovrebbe rinunciare, nella misura del possibile, ad assumere medicinali durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al suo medico o al suo farmacista.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin?

Salvo prescrizione medica contraria assumere 10 gocce ogni 15 min.-1h e consultare immediatamente il medico per chiarire la natura dei disturbi. In caso di affezioni croniche 10-15 gocce in poca acqua 3 volte al di prima dei pasti. Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin e informi il medico o il farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25° C). Conservare fuori della portata dei bambini. Altre informazioni possono essere fornite dal vostro medico o farmacista.

Le gocce contengono alcool 38 % Vol.

Che cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin?

10 ml contengono: Ammi visnaga D2 2 ml, Cytisus scparius (Spartium scorarium) D2 2 ml, Iberis amara D3 1 ml, Leonurus cardiaca D2 2 ml, Nерium oleander D3 1 ml, Sumbulus moschatus D2 2 ml.

Contiene alcool 38 % Vol.

Numeri dell'omologazione: 45093 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R66 Arrhythmin? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia su ricetta medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabbricante:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Data dell'ultima revisione da parte dell'autorità farmaceutica competente (Swissmedic) di questo foglietto illustrativo: 11/2004