



INFORMATION FÜR PATIENTINNEN UND PATIENTEN

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen. Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage anweisungswise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben. Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen

Homöopathisches Arzneimittel

Wann werden Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen bei Blasenschwäche mit unwillkürlichen nächtlichen Harnlassen angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Blasenschwäche kann viele Ursachen haben. Erkältungen, nervöse Störungen oder seelische Konflikte können solche Beschwerden auslösen. Bei wiederkehrenden oder andauernden Beschwerden und wenn Fieber auftritt ist ärztlicher Rat einzuholen.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, wenn Sie

– an anderen Krankheiten leiden,

– Allergien haben oder

– andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnehmen oder äusserlich anwenden!

Dürfen Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit angewendet werden?

Wenden Sie das Präparat nicht ohne vorherige Befragung eines Arztes an.

Wie verwenden Sie Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen?

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben, genügt bei Bettlässen kleinerer Kinder ab 5 Jahren die tägliche Einnahme von 3 mal täglich 8-10 Tropfen in ein Glas Wasser. Die Dosis kann nach 2-3 Wochen auf 2 mal täglich reduziert werden. Bei älteren Kindern verfahren man ebenso, erhöhe jedoch die Tropfenzahl auf 10-15 Tropfen. Bei Erwachsenen verbleibe man bei der dreimaligen Dosierung von 10-15 Tropfen über einen längeren Zeitraum.

Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn bei der Behandlung eines Kleinkindes / Kindes die gewünschte Besserung nicht eintritt, ist mit ihm ein Arzt bzw. eine Ärztin aufzusuchen. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

Welche Nebenwirkungen können Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen haben?

Für Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen sind bisher bei bestimmungsgemässem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ärztin oder Apothekerin.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen ab und informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP» bezeichneten Datum verwendet werden.

Bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) aufbewahren. Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin. Die Tropfen enthalten 35 Vol.-% Alkohol.

Was ist in Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen enthalten?

10 ml enthalten: Causticum Hahnemannii D30 1 ml, Ferri phosphas D8 2 ml, Kalii phosphas D12 2 ml, Pulsatilla pratensis D12 2 ml, Sepia officinalis D6 2 ml und als Hilfsstoffe Wasser und Alkohol. Enthält 35 Vol.-% Alkohol.

Zulassungsnummer: 45101 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin Tropfen? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken ohne ärztliche Verschreibung.

Tropfflaschen zu 50 ml.

Zulassungsinhaberin:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Herstellerin:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
Berliner Ring 32, D-64625 Bensheim

Diese Packungsbeilage wurde in 09/2005 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

INFORMATION DESTINÉE AUX PATIENTS

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin

Médicament homéopathique

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin peuvent être utilisées en cas de faiblesse de la vessie accompagnée de perte d'urine nocturne involontaire.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin peuvent être prises simultanément.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

De multiples causes peuvent être à l'origine d'une faiblesse de la vessie. Par exemple des refroidissements, des troubles nerveux ou affectifs. En cas de troubles fréquents ou durables, de même qu'en cas de fièvre, il convient de consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si:

– vous souffrez d'une autre maladie,

– vous êtes allergique,

– vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication).

Les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin peuvent-elles être prises pendant la grossesse ou l'allaitement?

Ne pas utiliser le médicament sans consultation médicale préalable.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin?

Sauf prescription contraire du médecin, contre l'enurésie nocturne des petits enfants (à partir de 5 ans), la prise de 8 à 10 gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau suffit. La fréquence de la dose peut être réduite au bout de 2 à 3 semaines à 2 fois par jour. Pour des enfants plus âgés on procède de même en augmentant les doses à 10 à 15 gouttes. Pour des adultes, prendre 10 à 15 gouttes trois fois par jour sur une période assez prolongée.

Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte. Si l'amélioration escomptée de l'enfant



en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient.

Conserver à température ambiante (15 – 25 °C) et hors de portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Les gouttes contiennent 35 % vol. d'alcool.

Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin?

10 ml contiennent: Causticum Hahnemanni D30 1 ml, Ferri phosphas D8 2 ml, Kalii phosphas D12 2 ml, Pulsatilla pratensis D12 2 ml, Sepia officinalis D6 2 ml, eau et alcool comme excipients. Contient 35 % vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation: 45101 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie sans ordonnance médicale.

Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabricant:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic): 09/2005.

INFORMAZIONI PER I PAZIENTI

Legga attentamente il foglietto illustrativo, perché contiene importanti informazioni. Questo medicamento le è stato prescritto dal medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica, in farmacia. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico o del farmacista al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin

Medicinale omeopatico

In quali casi trovano impiego le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin?

Secondo i canoni della medicina omeopatica le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin trovano principalmente impiego in caso di insufficienza urinaria con perdita involontaria di urina durante la notte.

Quali precauzioni sono da osservare durante il trattamento?

Nel caso in cui il medico le avesse già prescritto altri medicinali, chieda al suo medico o al suo farmacista se è possibile associare ad essi le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin.

Quando non si possono usare le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin e quando la loro somministrazione richiede prudenza?

L'incontinenza urinaria può avere eziologie differenti. Raffreddamenti, disturbi nervosi o conflitti psichici sono in grado di innescare questi disturbi. In caso di recidive o persistenza dei sintomi e di febbre, consultare un medico.

Informi il suo medico o il suo farmacista se:

- soffre di altre malattie,
- soffre di allergie,
- assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa).

Si possono somministrare le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin durante la gravidanza o l'allattamento?

Non si deve somministrare il prodotto senza consultare un medico.

Come usare le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin?

Salvo diversa prescrizione medica, si consiglia nell'enuresi notturna dei bambini piccoli, a partire dal quinto anno d'età, di somministrare 8-10 gocce in un bicchiere d'acqua 3 volte al giorno. Dopo 2-3 settimane ridurre le somministrazioni a 2 volte al giorno.

Per i bambini più grandi, si consiglia di procedere allo stesso modo, aumentando però a 10-15 gocce.

Per gli adulti 10-15 gocce, in poca acqua, 3 volte al giorno per un periodo prolungato.

Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se non si manifesta il miglioramento desiderato nel trattamento di un bambino piccolo / bambino, deve essere consultato un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto delle gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin. Se ciononostante osserva effetti collaterali dovrebbe informare il suo medico o il suo farmacista.

Nel corso dell'assunzione di medicinali omeopatici si può verificare un aggravamento temporaneo dei sintomi (aggravamento iniziale). In caso di aggravamento persistente interrompa il trattamento con le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin e informi il suo medico o farmacista.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicinale può essere utilizzato solamente fino alla data indicata con «EXP» sul contenitore. Conservare a temperatura ambiente (15-25 °C). Conservare fuori della portata dei bambini.

Altre informazioni possono essere fornite dal suo medico o farmacista.

Le gocce contengono alcool 35 % Vol.

Che cosa contengono le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin?

10 ml contengono: Causticum Hahnemanni D30 1 ml, Ferri phosphas D8 2 ml, Kalii phosphas D12 2 ml, Pulsatilla pratensis D12 2 ml, Sepia officinalis D6 2 ml e come eccipienti alcool e acqua. Contiene alcool 35 % vol.

Numeri dell'omologazione: 45101 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le gocce Dr. Reckeweg® R74 Nocturnin? Quali confezioni sono disponibili?

In vendita in farmacia senza ricetta medica.

Flaconi di gocce da 50 ml.

Titolare dell'omologazione:

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA
Route de la Glâne 4, CH-1680 Romont

Fabbricante:

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH
D - 64625 Bensheim

Data dell'ultima revisione da parte dell'autorità farmaceutica competente (Swissmedic) di questo foglietto illustrativo: 09/2005.

